


Guide d'enseignement

Chirurgies ORL

Septoplastie, rhinoplastie,
septorhinoplastie, chirurgie des
cornets et endoscopie des sinus

Le but de ce document est de vous informer sur votre chirurgie ORL (avant, pendant, après et lors de votre retour à domicile).

Structures anatomiques du nez



Structures externes

Os du nez : forme le squelette du nez avec le cartilage

Cartilage : forme le squelette du nez avec les os du nez

Cloison nasale : sépare les cavités nasales

Structures internes

Cavité nasale : constituée d'os et de cartilage. Séparée au centre par la cloison nasale. Composée à l'avant par du cartilage et communique à l'arrière avec le nasopharynx

Sinus : cavité dans un des os du visage remplie d'air et recouverte d'une muqueuse. Plusieurs sinus sont regroupés autour de la cavité nasale. L'air provenant des cavités nasales entre dans les sinus. Le mucus sécrété par les sinus s'écoule dans les cavités nasales.

Cornets : os fins des cavités nasales qui sont recouverts d'une muqueuse. Varie en volume pour réchauffer et humidifier l'air.

Différents types de chirurgie ORL

Voici les différentes chirurgies ORL traitées dans ce guide :

- **La septoplastie** consiste à repositionner une déviation de la cloison nasale. Cette chirurgie améliore la respiration. Des mèches (bandes de pansement) ou un autre pansement peuvent être insérées dans les 2 cavités nasales pour quelques jours. Un pansement est placé sous votre nez (aussi appelé moustache).
- **Rhinoplastie** : consiste à repositionner l'os du nez ou la pointe cartilagineuse, souvent après un accident. Cette chirurgie corrige l'apparence du nez. Des mèches peuvent être insérées dans les 2 cavités nasales pour quelques jours. Un pansement est placé sous votre nez. Une attelle nasale (plâtre) est placée sur votre nez.
- **La septorhinoplastie** est une combinaison d'une septoplastie et d'une rhinoplastie.
- **La chirurgie des cornets** consiste à diminuer le volume des cornets inférieurs qui causent un blocage nasal. Cette chirurgie permet d'améliorer la respiration. Des mèches peuvent être insérées dans les 2 cavités nasales pour quelques jours.
- **L'endoscopie des sinus** consiste en une exploration visuelle de vos sinus. Cette intervention permet d'identifier la problématique et de la corriger.

Préparation avant et après la chirurgie

Consulter le document « Chirurgie d'un jour : Informations générales AVANT et APRÈS la chirurgie ».¹

Soins après la chirurgie et recommandations

Consulter l'information complète pour vous préparer à votre chirurgie :

Vous pourrez retourner à la maison le jour de la chirurgie. Il est possible que vous ressentiez de la douleur. Vous pouvez aussi avoir de légers saignements de nez, de la toux, des éternuements et des maux de tête. Voici quelques recommandations à suivre.

Que faire avec mon pansement, mes mèches ou mon attelle (plâtre) ?

- Il est possible que votre nez coule jusqu'à 1 mois après l'opération. Le liquide sera rouge au début puis rosé ou blanc. Éviter de vous moucher au cours des

¹ Disponibles sur le site internet du CHU de Québec-Université Laval.

premiers jours suivant votre chirurgie selon la recommandation de votre chirurgien. Vous pouvez essuyer votre nez avec un papier mouchoir.

- Éternuer la bouche ouverte.
- Votre médecin vous précisera quand vos pansements seront retirés (exemple : Silastic^{MD}). Ils sont fixés avec des points de suture et habituellement retirés 7 à 10 jours après l'opération. Certains sont fondants (exemple : NasoPore^{MD}) et n'auront pas besoin d'être retirés. L'infirmière vous donnera les consignes à respecter avant votre départ.
- Changer votre pansement sous votre nez dès qu'il est souillé (sang).
- Il est possible que vous ayez des mèches dans votre nez pour contrôler les saignements. Si vous avez des mèches :
 - Ne pas modifier ou couper la mèche devant votre nez.
 - Les mèches sont habituellement retirées lors de votre rendez-vous de contrôle 2 à 3 jours après la chirurgie.
 - La présence d'un accompagnateur adulte est recommandée lors du rendez-vous de retrait des mèches. Il peut arriver que vous ayez des symptômes incommodants (exemple : saignement, chute de pression) après le retrait des mèches. Le personnel soignant sera présent pour vous assister.
 - Après le retrait des mèches, il y aura de l'enflure. La congestion du nez est normale et peut durer de quelques jours à quelques semaines.
 - Vous pouvez commencer à nettoyer l'intérieur de votre nez dès le retrait de la mèche.
 - Les symptômes suivants sont normaux: larmoiement, pression au niveau des yeux et des joues, mal de dents, sécheresse de la bouche, légers maux de tête et toux.
- Si vous avez une petite attelle (plâtre), vous devez la conserver sur votre nez pour 7 à 10 jours (septorhinoplastie ou une rhinoplastie). Elle sera retirée lors d'un rendez-vous de contrôle.

Que dois-je faire pour aider à ma guérison?

- Après votre chirurgie, nettoyer l'intérieur de votre nez avec de l'eau salée que vous achetez à la pharmacie (exemple : Salinex^{MD}, Hydrasens^{MD}). Nettoyez 1 à 4 fois par jour pour 1 mois. Cela facilitera l'évacuation des sécrétions.
- Après chaque nettoyage de votre nez, nettoyer l'embout de la bouteille d'eau salée avec de l'eau chaude savonneuse. Laisser sécher l'embout de la bouteille à l'air libre afin de diminuer la contamination par les bactéries.
- Vous pouvez porter vos lunettes selon votre confort, à moins d'avis contraire de votre médecin.
- Éternuer la bouche ouverte pendant la première semaine.
- Si votre médecin vous a prescrit des antibiotiques, il est important de les prendre jusqu'à la fin.

Que faire si j'ai de la douleur ?

- Des médicaments contre la douleur (calmants) vous seront prescrits. N'hésitez pas à les prendre selon les indications du pharmacien.
- À la suite d'une septorhinoplastie, il est possible que vos paupières soient gonflées et le contour des yeux bleuté. Vous pouvez appliquer des compresses froides pendant 10 minutes quelques fois par jours afin de faire diminuer l'enflure.
- Si vous avez un humidificateur, utilisez-le dans la pièce où vous dormez. Cela aidera à garder la muqueuse de votre nez et de votre bouche bien humide.

Quand puis-je reprendre mes activités quotidiennes?

- Alimentation : Normale
- Soins corporels : Vous pouvez prendre une douche ou un bain dès le lendemain de la chirurgie. La température de l'eau ne doit pas être trop chaude. Ne pas mouiller votre pansement.
- Sommeil :
 - Installer 2 à 3 oreillers sous votre tête lorsque vous êtes allongés pendant 1 semaine à la suite de votre chirurgie. Ceci diminuera l'enflure.
 - Si vous avez un CPAP, votre médecin ORL vous précisera quand vous pourrez recommencer à l'utiliser. Le temps d'arrêt est généralement de 10 à 21 jours.
- Activité physique :
 - Ne pas soulever d'objet plus lourd que 10 livres pendant 14 premiers jours suivant votre chirurgie.
 - Éviter de vous pencher pendant les 14 premiers jours (exemple : passer la balayeuse, vider et remplir le lave-vaisselle, etc.).
 - Éviter les activités physiques soutenues qui peuvent causer des saignements de nez (exemple : course à pieds) les 21 premiers jours suivant la chirurgie. Éviter les sports de contact pendant 6 semaines.
- Arrêt de travail : Votre chirurgien vous dira quand vous pourrez retourner au travail. Il faut prévoir habituellement 10 à 21 jours de convalescence.
- Conduite automobile : Il faut prévoir quelques jours avant que vous retrouviez les aptitudes nécessaires à la conduite automobile. En effet, vous pourrez conduire lorsque vous n'aurez plus d'étourdissements et que vous ne prendrez plus de médicaments contre la douleur pendant plus de 24 heures.

Quand dois-je revoir mon chirurgien?

Vous aurez un rendez-vous de suivi avec votre chirurgien après votre chirurgie. Vous aurez les informations pour ce rendez-vous le jour de votre départ de l'hôpital.



Si vous avez des questions :

- appelez au 418-525-4444 et demandez à parler à la centrale de rendez-vous en ORL en nommant l'hôpital où vous avez eu votre chirurgie.

Soyez vigilant! Vous devez vous présenter à l'urgence de votre hôpital si :

- Étourdissements ou perte de conscience.
- Changement dans votre vision.
- Saignement de nez persistant, soit qui ne s'arrête pas malgré une pression sur les ailes du nez pendant plus de 10 minutes

- Difficulté à respirer.
- Vomissements de sang rouge clair
- Changement de pansement (moustache) nécessaire à toutes les heures car il y a un écoulement important.

Appeler votre infirmière à la clinique externe ou votre chirurgien ORL si :

- Douleurs qui augmentent même avec les médicaments.
- Maux de tête sévères.
- Frissons ou fièvre (température supérieure à 38,5°C ou 100 °F).

- Crachats de sang clair observés à plusieurs reprises.
- Écoulement jaunâtre ou verdâtre du nez.
- Pansement sous votre nez est imbibé de sang plusieurs fois dans la journée.

Si vous ne réussissez pas à parler à votre infirmière ou à votre médecin ORL, rendez-vous à l'urgence rapidement de l'hôpital où vous avez été opéré ou le plus proche.

Il est important de suivre aussi les surveillances indiquées dans le guide d'enseignement préopératoire qui complète ce document.

Notes personnelles :

Ce guide émet des recommandations conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa parution, soit le 6 janvier 2025. Toutefois, ces recommandations n'ont aucunement pour effet de remplacer le jugement d'un clinicien. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre professionnel de la santé. Si d'une façon ou d'une autre vous faisiez une mauvaise utilisation de l'information contenue dans ce document, le CHU de Québec ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.



Droits d'auteur

Aucune reproduction complète ou partielle de ce document n'est permise sans l'autorisation écrite du CHU de Québec-Université Laval et autre(s) au besoin. © CHU de Québec ou autre(s) au besoin, 2025.
Toutefois, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour un usage professionnel.