

CellCept^{MD} (mycophénolate mofétil) Myfortic^{MD} (acide mycophénolique) Secteur de néphrologie

À quoi sert le mycophenolate?

- Il est utilisé pour traiter les maladies du système immunitaire, telles que la glomérulonéphrite (inflammation des reins) ou la vascularite (inflammation des vaisseaux sanguins).
- Il agit en ralentissant le système immunitaire, ce qui a pour effet de contrôler la maladie. Il fait partie de la famille des immunosuppresseurs.

Comment prendre le médicament ?

- Ce médicament est à prendre **deux fois par jour aux 12 heures**. Il est à prendre toujours à la même heure, chaque jour. Assurez-vous de prendre la bonne dose.
- Prendre à jeun ou en mangeant, **mais idéalement toujours de la même manière**.
- Ce médicament doit être pris de façon régulière et continue. Assurez-vous de faire renouveler vos médicaments en avance pour ne pas en manquer.
- Ce médicament doit être **avalé entier**. Il ne doit pas être coupé, croqué ou écrasé et la capsule ne doit pas être ouverte.

Quel est le suivi nécessaire?

- Votre médecin vous prescrira des analyses de sang régulières pour vérifier la sécurité du traitement. Les prises de sang seront moins fréquentes lorsque votre condition sera stabilisée.

Précautions générales

- Ce traitement peut interagir avec plusieurs autres médicaments. Avant de débiter un nouveau médicament, incluant les médicaments de vente libre et les produits de santé naturelle, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de problème d'interaction avec votre pharmacien ou votre médecin.
- Évitez qu'une autre personne ne touche à vos capsules. Lavez-vous les mains après avoir touché à vos capsules.
- Gardez vos médicaments dans leur emballage d'origine à un endroit sec, protégé du soleil et à température pièce. Ne laissez pas vos médicaments dans la salle de bain.
- Si vous êtes une femme ou un homme en âge de procréer, utilisez une **méthode de contraception efficace jusqu'à six (6) semaines après l'arrêt du médicament**. Si vous souhaitez concevoir un enfant, parlez-en à votre équipe médicale spécialisée en néphrologie.

Aviser votre médecin ou pharmacien si:

- Vous avez des nausées et vomissements qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
- Vous avez des signes d'infection.
- Consultez à l'urgence si vous faites de la fièvre (38,3° ou 101 F).

Quels sont les effets secondaire possibles du CellCept?

Effets indésirables	Mesures à prendre
Votre système immunitaire est moins actif, ce qui peut augmenter le risque d'infection.	Vous êtes plus à risque de contracter des infections durant cette période. • Lavez-vous les mains souvent. • Durant cette période, évitez d'entrer en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses (ex. rhume, grippe, COVID-19). • Signalez-nous rapidement tous signes d'infections (ex. fièvre, frisson, toux, maux de gorge, douleur lorsque vous urinez). • Consultez votre médecin ou présentez-vous immédiatement à l'urgence si vous faites de la fièvre (38,3°C ou 101 F).
Selles molles ou diarrhées	La diarrhée peut s'améliorer avec le temps. Si elle aggrave, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Des maux de cœur et des vomissements légers	À la maison, vous pourrez prendre des antinauséeux au besoin pendant 1 à 2 journées, selon le cas. Communiquez avec votre médecin si vous avez des maux de cœur, des vomissements ou des maux d'estomac qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
Risques augmentés de certains cancers, dont le cancer de la peau	• Évitez l'exposition directe au soleil. • Appliquez régulièrement de l'écran solaire (FPS 45 ou plus) aux 2 heures et à la sortie de l'eau lors de baignade. • Portez un chapeau et des vêtements longs.

Quoi faire en cas d'oubli?

Si retard de **moins de 6 heures** : prendre la dose manquée dès que possible et prendre la prochaine dose à l'heure prévue. Si retard de **6 heures ou plus** : appeler votre pharmacien pour déterminer la conduite à suivre. **Ne pas doubler la dose.**

Nom du professionnel qui m'a remis le feuillet : _____

Notes :
