

Annexe - 1 Tableau des médicaments à cesser avant une spirométrie post bronchodilatateur

Classes de médicament	Noms génériques	Noms commerciaux usuels (exemples)	Délai d'arrêt avant le test
Médicament inhalé			
Agonistes Beta-2 à courte durée d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol • Terbutaline 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventolin^{MD}, Airomir^{MD}, Apo-Salvent^{MD} • Bricanyl^{MD} 	4 heures
Agonistes Beta-2 à longue durée d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Formotérol • Salmétérol • Combinaison avec Formotérol • Combinaison avec Salmétérol 	<ul style="list-style-type: none"> • Oxeze^{MD}, Foradil^{MD} • Serevent^{MD} • Symbicort^{MD}, Zenhale^{MD} • Advair^{MD} 	12 heures
Agonistes Beta-2 à ultra longue durée d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Indacatérol • Combinaison avec Vilantérol 	<ul style="list-style-type: none"> • Onbrez^{MD} • Breo^{MD} 	24 heures
Anticholinergiques à courte durée d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Ipratropium • Combinaison avec ipratropium 	<ul style="list-style-type: none"> • Atrovent^{MD}, Apo-Ipravent^{MD} • Combivent^{MD}, Teva-Combo^{MD}, Duovent^{MD} 	4 heures
Anticholinergiques à longue durée d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Aclidinium • Glycopyrronium • Tiotropium • Uméclidinium • Combinaison avec Aclidinium • Combinaison avec Glycopyrronium • Combinaison avec Tiotropium • Combinaison avec Uméclidinium • Combinaison avec Uméclidinium 	<ul style="list-style-type: none"> • Tudorza^{MD} • Seebri^{MD} • Spiriva^{MD} • Incruse^{MD} • Duaklir^{MD} • Ultibro^{MD} • Inspiolt^{MD} • Anoro^{MD} • Trelegy^{MD} 	24 heures

Comité de pharmacologie : 2020-09-15