CHU de Québec Université Laval

CQ11343

NOM USAGER :

PRENON USAGER :

RAMQ :

Tel :

Courriel :

NOM, PRENOM MÈRE :

NOM, PRENOM PÈRE :

ID

RÉFÉRENCE ACCUEIL CLINIQUE
CLINIQUE DU PREMIER TRIMESTRE DE GROSSESSE

Grossesse de moins de 12 semaines **avec au moins une** des indications de référence ci-dessous :


- ☐ Critère(s) échographique(s) de grossesse arrêtée
- ☐ Critère(s) échographique(s) d'évolution incertaine
- ☐ Saignement vaginal sans visualisation d'un CF IU
- ☐ Douleur pelvienne sans visualisation d'un CF IU
- ☐ Facteur de risque de localisation extra-utérine :
  - ☐ Stérilet intra-utérin lors de la conception
  - ☐ ATCD de GEU
  - ☐ ATCD d'infection pelvienne
  - ☐ ATCD de chirurgie tubaire

☐ **Absence de contre-indications vérifiées :**

- Saignement vaginal actif abondant (plus 1 serviette/h)
- Douleur abdomino-pelvienne importante actuelle ou récente
- Évaluation ou suivi nécessaire avant le prochain 24h ouvrable
- Hémodynamie instable

Si présence de contre-indications , référer à l'urgence ou contacter directement le gynécologue de garde

Résultat de β-HCG sérique **de moins de 48h** : _____ UI/
Si possible : Progestérone sérique _____nmol/L , Hb-HT, Gr Rh si grossesse 8 semaines ou plus



1-2-3-4-5-6 voir explications/critères au verso

Informations sur l'usagère:

☐ **N° de téléphone de l'entête vérifié(s)** Autre N° de téléphone : (_____) _____-_____

Courriel : _____ DDM (aaaa/mm/jj) : _____

Autres informations : _____ ☐ Besoin d'un interprète, langue : _____

☐ Groupe Rh négatif connu, WinRho[SDF] administré ☐ oui le (aaaa/mm/jj) : _____ ☐ non

Identification du demandeur

Nom, prénom : _____ Fonction : _____# de permis : _____

Urgence ou clinique : _____ Assurerez–vous le suivi de la grossesse si celle-ci est évolutive ? ☐ Oui ☐ Non

Signature : _____ Date (aaaa/mm/jj) : _____ Heure (hh:mm) _____

IMPORTANT : Faxer cette requête au 418-654-3482 avant envoi au dossier patient électronique (DPE)

Nom : Prénom : # Dossier :

[1]Dépliant explicatif β-HCG urinaire à domicile dans 14 jours

Aviser l'usagère de faire un test de dépistage urinaire à domicile dans 14 jours et de nous appeler si le test est positif.
Si le test est négatif, aucun suivi n'est nécessaire.
Remettre le dépliant explicatif ou le formulaire CQ 13047 TestGrossesseUrinaire

[2] ÉDU inscrire vos résultats si dessous :

[3] Échographie formelle

Compléter une demande d'examen d'échographie obstétricale (disponible sur le site du CHU de Québec ou CQ11188)
Acheminer par fax : CHUL : 418-577-2062 HSFA : 418-525-4159 Centrale: 418 682-7772
Demande d'examen d'échographie obstétricale | CHU de Québec-Université Laval

[4] Critères GIU arrêtée et [5]GIU d'évolution incertaine

[4] Critères de GIU arrêtée:

- LCC 7mm ou plus sans CF positif
- Sac gestationnel **25mm ou plus**, sans embryon
- Absence de CF positif, 11 jours ou plus post écho montrant sac gestationnel **avec** vésicule
- Absence de CF positif, 14 jours ou plus post écho montrant sac **sans** vésicule

[5] Critères de GIU d'évolution incertaine :

Critères échographiques :

- LCC de moins de 7 mm sans CF positif
- Sac gestationnel 16-24 mm sans embryon
- Absence de CF positif 7-10 jours post écho montrant sac avec vésicule
- Absence de CF positif 7-13 jours post écho montrant sac sans vésicule
- Absence d'embryon 6 semaines ou plus après DDM
- Vésicule vitelline plus grande que 7 mm
- Diamètre du sac gestationnel plus petit que LCC+5mm

Critère clinique :

- Saignement significatif (modéré ou abondant)

[6]Prise en charge de l'usagère en attente de consultation à la clinique premier trimestre

Aviser l'usagère de demeurer accompagnée d'un adulte en tout temps jusqu'à ce que la grossesse soit localisée, de se présenter à l'urgence si douleur vive à l'abdomen ou aux épaules, si saignement plus important qu'une serviette à l'heure pour 3h ou si lipothymie. Lui remettre le dépliant ou le formulaire CQ11373. Elle recevra un appel de l'infirmière de la clinique dans le prochain 24-48h ouvrable
Grossesse | CHU de Québec-Université Laval

Offre de service de l'accueil clinique du premier trimestre

L'objectif de la clinique du premier trimestre est d'assister le professionnel de première ligne à préciser la localisation et l'évolution de la grossesse lorsque celle-ci comporte des facteurs de risques ou des signes de complications et de prendre en charge ces complications.

L'investigation doit d'abord avoir été amorcée lors de la visite initiale en première ligne et les résultats d'examens vus. Il est possible que nos services ne soient pas requis (β-HCG négatif, présence d'une grossesse intra-utérine évolutive). Notre rôle est d'assurer le suivi lorsque la condition ne peut pas être gérée par la première ligne. Les soins seront alors coordonnés par une infirmière clinicienne en étroite collaboration avec le gynécologue de garde.

Si une grossesse intra utérine évolutive est confirmée, l'usagère sera libérée de la clinique et référée pour suivi de grossesse.

La clinique du premier trimestre ne prend pas en charge le dépistage prénatal ni le conseiling associé.

N'hésitez pas à faire codifier le gynécologue de garde si vous avez des inquiétudes par rapport à une usagère

Notes complémentaires

Légende : CF : cœur fœtal **IU** : Intra-utérin **EDU** : échographie d'urgence **GLI** : Grossesse à localisation indéterminée **GIU** : Grossesse intra utérine
GEU : Grossesse extra utérine **Gynéco** : gynécologue