



**PRÉPARATION POUR UNE TOMOSCINTIGRAPHIE**  
**MYOCARDIQUE (MIBI) – MÉDECINE NUCLÉAIRE**

POIDS : \_\_\_\_\_ kg                      TAILLE : \_\_\_\_\_ cm                      SURFACE CORPORELLE : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 ALLERGIES : \_\_\_\_\_                      INTOLÉRANCES : \_\_\_\_\_

**RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**PRÉCISER LE TEST DÉSIRÉ**

- AU DIPYRIDAMOLE (MIBI PERSANTIN<sup>MD</sup>)**                       **À LA DOBUTAMINE (MIBI-DOBUTAMINE)**  
 **À L'EFFORT (MIBI À L'EFFORT)**                       **AU REPOS SEUL OU PER DOULEUR (MIBI-REPOS)**

N.B. Si bloc de branche gauche ou rythme de pacemaker, préférer le test au dipyridamole.

**Omettre les médicaments suivants selon le délai prescrit et jusqu'à la fin de l'examen (reprendre immédiatement après la stimulation pharmacologique ou à l'effort, le jour même).**

- Nitrates per os et le nicorandil (Ikorel<sup>MD</sup>) : le jour avant et le matin de l'examen
- Timbres de nitrates ou nitrates topiques : omettre à partir de 20 h la veille de l'examen
- Inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase per os : 2 jours avant, le jour avant et le matin de l'examen.
- Dérivés de la théophylline : 2 jours avant, le jour avant et le matin de l'examen.
- Médicament ou produit contenant de la caféine : le jour avant et le matin de l'examen

**À la discrétion du médecin prescripteur : (cocher ci-dessous pour suspendre la médication si jugé pertinent)**

- Bêta-bloqueurs per os** : le jour avant et le matin de l'examen. Spécifier si durée différente : \_\_\_\_\_
  - Dans tous les cas, poursuivre sotalol (ne pas cesser)
- Bloquants des canaux calciques per os** : le jour avant et le matin de l'examen.  
Spécifier si durée différente : \_\_\_\_\_
- Autre(s) médicament(s)** : \_\_\_\_\_ Durée : \_\_\_\_\_

Le terme «examen» réfère à la portion de stimulation pharmacologique ou à l'effort du test. Voir les renseignements au verso pour le médecin prescripteur. L'ordonnance ne s'applique pas aux perfusions intraveineuses.

Pour le pharmacien : Si la case n'est pas cochée, considérer que le médecin veut poursuivre la médication.

**Section réservée au secrétariat de médecine nucléaire ou au personnel infirmier**  
**Date de l'examen (stimulation pharmacologique ou à l'effort) (aaaa/mm/jj) :** \_\_\_\_\_  
**Copie conforme à envoyer à :** \_\_\_\_\_  
 Si usager en externe, Pharmacie tél. : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_

**Transmission confidentielle par télécopieur** (Règlement CMQ, norme 2008.01 OPQ)

**Avis de confidentialité :** Ce document contient des informations confidentielles. Son contenu doit être protégé. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en informer l'expéditeur immédiatement.

**Certification du prescripteur :** Je certifie que ce document est une ordonnance originale, le pharmacien identifié est le seul destinataire, l'original N'EST PAS UTILISÉ, il est conservé au dossier-usager du CHU de Québec – Université Laval.

**Signature médicale (ou autorisée) :** \_\_\_\_\_

**DATE (aaaa/mm/jj) :** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Copie Conforme :** \_\_\_\_\_

Acceptation au CMDP :

(                      )

**MÉDECINE NUCLÉAIRE, PRÉPARATION POUR UNE TOMOSCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE (MIBI) (suite)****RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'OMISSION DE MÉDICAMENTS EN VUE DE L'EXAMEN**

- Les nitrates per os, le nicorandil (Ikorel<sup>MD</sup>) et les inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase seront omis **automatiquement**.
- Pour tous types d'examens au MIBI, l'omission des bêta-bloqueurs (seuls ou en combinaison) et bloquants des canaux calciques (seuls ou en combinaison) est suggérée la veille et le matin de l'examen, **si cela est sécuritaire au niveau médical**.
- Si stimulation à la dobutamine : Les bêta-bloqueurs (seuls ou en combinaison) et bloquants des canaux calciques non-dihydropyridines (seuls ou en combinaison) doivent être omis la veille et le matin de l'examen **si cela est sécuritaire au niveau médical** (vérifier la stabilité de l'utilisateur).
- Si stimulation au dipyridamole (Persantin<sup>MD</sup>) : l'AAS-dipyridamole (Aggrenox<sup>MD</sup>) doit être omis l'avant-veille, la veille et le matin de l'examen **si cela est sécuritaire au niveau médical** (le prescrire dans « autre médicament »), sinon l'examen ne sera pas effectué (Comme alternative, prescrire une stimulation à la DOBUTamine)
- L'ordonnance ne s'applique pas aux perfusions intraveineuses. Le médecin prescripteur doit faire une prescription au dossier s'il désire sevrer une perfusion intraveineuse

Acceptation au CMDP :

( )



## PRÉPARATION POUR UNE TOMOSCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE (MIBI) – MÉDECINE NUCLÉAIRE

OMISSION DE MÉDICAMENTS LORS D'UNE TOMOSCINTIGRAPHIE-MYOCARDIQUE													
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE À L'USAGE DU PHARMACIEN, SVP NE RIEN INSCRIRE SUR CE DOCUMENT													
<p>Liste de médicaments à omettre selon le délai prescrit à la page 1, s'il y a lieu. Cette liste est non exhaustive et doit être ajustée si besoin. Si combinaison contenant un médicament qui doit être omis, omettre la combinaison au complet pour la durée prescrite (ex. : amlodipine + atorvastatine)</p>													
<b>Bêta-Bloquants (Omettre seulement si prescrit par le médecin à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;">▪ Acébutolol</td> <td style="width: 25%; border: none;">▪ Atenolol</td> <td style="width: 25%; border: none;">▪ Bisoprolol</td> <td style="width: 25%; border: none;">▪ Carvédilol</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">▪ Labétalol</td> <td style="border: none;">▪ Metoprolol</td> <td style="border: none;">▪ Nadolol</td> <td style="border: none;">▪ Névibolol</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">▪ Pindolol</td> <td style="border: none;">▪ Propranolol</td> <td style="border: none;">▪ Timolol</td> <td></td> </tr> </table>		▪ Acébutolol	▪ Atenolol	▪ Bisoprolol	▪ Carvédilol	▪ Labétalol	▪ Metoprolol	▪ Nadolol	▪ Névibolol	▪ Pindolol	▪ Propranolol	▪ Timolol	
▪ Acébutolol	▪ Atenolol	▪ Bisoprolol	▪ Carvédilol										
▪ Labétalol	▪ Metoprolol	▪ Nadolol	▪ Névibolol										
▪ Pindolol	▪ Propranolol	▪ Timolol											
<b>Bloquants calciques dihydropyridines (Omettre seulement si prescrit par le médecin à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">▪ AmLODIPine</td> <td style="width: 33%; border: none;">▪ Felodipine</td> <td style="width: 34%; border: none;">▪ NIFÉdipine (courte action action prolongée)</td> </tr> </table>		▪ AmLODIPine	▪ Felodipine	▪ NIFÉdipine (courte action action prolongée)									
▪ AmLODIPine	▪ Felodipine	▪ NIFÉdipine (courte action action prolongée)											
<b>Bloquants calciques non-dihydropyridines (Omettre seulement si prescrit par le médecin à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">▪ Diltiazem (courte action) (action prolongée)</td> <td style="width: 50%; border: none;">▪ Verapamil (courte action) (action prolongée)</td> </tr> </table>		▪ Diltiazem (courte action) (action prolongée)	▪ Verapamil (courte action) (action prolongée)										
▪ Diltiazem (courte action) (action prolongée)	▪ Verapamil (courte action) (action prolongée)												
<b>Nitrates (Omettre d'emblée selon prescription à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">▪ Isosorbide dinitrate</td> <td style="width: 33%; border: none;">▪ Isosorbide mononitrate</td> <td style="width: 34%; border: none;">▪ Nitroglycérine sublinguale (comprimé/pompe)</td> </tr> </table>		▪ Isosorbide dinitrate	▪ Isosorbide mononitrate	▪ Nitroglycérine sublinguale (comprimé/pompe)									
▪ Isosorbide dinitrate	▪ Isosorbide mononitrate	▪ Nitroglycérine sublinguale (comprimé/pompe)											
Topique : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100%; border: none;">▪ Nitroglycérine (onguent)</td> </tr> </table>	▪ Nitroglycérine (onguent)	Transdermique : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100%; border: none;">▪ Nitroglycérine (timbre)</td> </tr> </table>	▪ Nitroglycérine (timbre)										
▪ Nitroglycérine (onguent)													
▪ Nitroglycérine (timbre)													
<b>Inhibiteur de la 5-phosphodiesterase (Omettre d'emblée selon prescription à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">▪ Sildénafil</td> <td style="width: 33%; border: none;">▪ Tadalafil</td> <td style="width: 34%; border: none;">▪ Vardénafil</td> </tr> </table>		▪ Sildénafil	▪ Tadalafil	▪ Vardénafil									
▪ Sildénafil	▪ Tadalafil	▪ Vardénafil											
<b>Dérivés de la théophylline (Omettre d'emblée selon prescription à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100%; border: none;">▪ Théophylline (comprimé/sirop)</td> </tr> </table>		▪ Théophylline (comprimé/sirop)											
▪ Théophylline (comprimé/sirop)													
<b>Médicaments ou produits contenant de la caféine (Omettre d'emblée selon prescription à la page 1)</b>													
Omettre tous les médicaments ou produits contenant de la caféine la veille et le matin de l'examen.													
<b>Ikorel<sup>md</sup> (Nicorandil) (Omettre d'emblée selon prescription à la page 1)</b>													
PO : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100%; border: none;">▪ Nicorandil</td> </tr> </table>		▪ Nicorandil											
▪ Nicorandil													
<b>Aggrenox<sup>md</sup> (AAS-dipyridamole) (Omettre seulement si prescrit par le médecin à la page 1)</b>													
Si MIBI au Persantin <sup>MD</sup> , l'examen ne pourra pas être effectué si ce médicament n'a pas été suspendu l'avant-veille, la veille et le matin de l'examen. Omettre si prescrit. Si cela n'a pas été fait et qu'un MIBI au Persantin <sup>md</sup> a été prescrit, communiquer avec le MD traitant.													

( )