



Guide d'enseignement

Gastroentérologie

Manométrie œsophagienne

Qu'est-ce qu'une manométrie œsophagienne?

Cet examen permet d'étudier le fonctionnement de l'œsophage. L'œsophage est le tube entre la bouche et l'estomac. L'œsophage est composé de muscles qui font des pressions pour faire avancer la nourriture et les liquides jusqu'à l'estomac. La manométrie permet de mesurer ces pressions.

Quelles sont les étapes l'examen?

- L'examen dure environ 30 minutes.
- L'infirmière vous expliquera les étapes. N'hésitez pas à poser vos questions.
- Vous serez allongé en position semi-assise.
- Un médicament est vaporisé dans votre narine pour engourdir l'intérieur du nez.
- Un tube est inséré dans votre narine et descend jusque dans votre estomac.
- Pendant l'examen, l'infirmière vous demandera d'avaler. Cela permet de mesurer les pressions dans l'œsophage.
- À la fin de l'examen, l'infirmière enlève le tube.

Les complications possibles à l'examen

Les complications sont rares, certains patients ont parfois :

- Des haut-le-cœur ou vomissements.

- Une irritation du nez ou de la gorge qui peut causer de légers saignements.

La préparation pour cet examen

DOIS-JE CONTINUER À PRENDRE MES MÉDICAMENTS?

Si vous êtes diabétique et prenez des médicaments pour le diabète, communiquez avec le médecin qui s'occupe de votre diabète pour connaître la conduite à tenir concernant l'arrêt et la reprise de vos médicaments.

SI VOTRE EXAMEN EST PRÉVU LE MATIN (ENTRE 8H ET 12H)

- Ne pas boire ni manger à partir de minuit la veille de l'examen.
- Ne prenez pas vos médicaments le matin, mais apportez-les avec vous à votre rendez-vous.

SI VOTRE EXAMEN EST EN APRÈS-MIDI

- Prenez un déjeuner normal avant 8h le matin. Ensuite après 8h le matin, ne pas boire ni manger jusqu'à l'examen.
- Prenez vos médicaments habituels, sauf ceux qu'on vous a demandé de ne pas prendre (ex. médicaments pour le diabète ou l'estomac). **Voir la liste des différents médicaments pour l'estomac à l'avant-dernière page du document.**

Avisez l'infirmière si :

- Vous avez des allergies ou avez déjà fait des réactions à des médicaments.
- Vous prenez des médicaments pour l'estomac (voir la liste) ou des médicaments pour éclaircir le sang (ex. Aspirine, Coumadin, Eliquis, Xarelto, Plavix, Brilinta, Fragmin, Lovenox, héparine, etc.).
- Vous êtes diabétique.
- Vous êtes porteur d'un pacemaker.

Quoi surveiller après l'examen?

Vous devez attendre une heure après la fin de l'examen avant de boire, manger ou fumer pour éviter de vous étouffer (seulement si l'infirmière gèle la gorge).

Planifiez votre visite

- Laissez vos bijoux et vos objets de valeur à la maison.
- Apportez la liste à jour de tous vos médicaments. Demandez-là à votre pharmacien.
- Apportez votre carte d'assurance maladie et votre carte d'hôpital. Si vous n'avez pas de carte d'hôpital, présentez-vous à l'admission au local A-0310 avant votre examen (à l'entrée principale à côté des agents de sécurité).

Liste des médicaments que le médecin peut vous avoir demandé de cesser avant de passer votre examen.	
<p>Agents de motilité gastrique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métoclopramide (Maxeran^{MD}, Reglan^{MD}) • Dompéridone (Motilium^{MD}) 	<p>Antihistaminiques de type H2 (anti-H2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Famotidine (Pepcid^{MD}) • Ranitidine (Zantac^{MD}) • Nizatidine (Axid^{MD})
<p>Antiacides</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium/alginat (Gaviscon^{MD}) • Calcium (Tums^{MD}) • Aluminium/magnésium (Maalox^{MD}) • Calcium/magnésium (Rolaids^{MD}) • Aluminium/magnésium (Diovol Plus^{MD}) • Aluminium (Amphojel^{MD}) 	<p>Bloqueurs de canaux calciques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérapamil (Isoptin^{MD}, Verelan^{MD}) • Diltiazem (Cardizem^{MD}, Tiazac^{MD}) • Nifédipine (Adalat^{MD}) • Félodipine (Plendil^{MD}, Renedil^{MD})
<p>Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oméprazole (Losec^{MD}) • Ésoméprazole (Nexium^{MD}) 	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pantoprazole (Pantoloc^{MD})• Rabréprazole (Pariet^{MD})• Lansoprazole (Prevacid^{MD})• Dexlansoprazole (Dexilant^{MD}) | |
|--|--|

Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre examen, composez le (418) 525-4444 au poste 47745 (lundi au vendredi entre 8h et 16h)

Où se rendre pour passer l'examen

Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL)	2705, boul. Laurier, Québec, G1V 4G2 : local K-0526 Entrée principale, tourner à droite après la boutique de cadeaux, suivre les flèches blanches au sol vers la gastroentérologie.
---	--

Notes personnelles :

Ce guide émet des recommandations conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa parution, soit le 14 octobre 2022. Toutefois, ces recommandations n'ont aucunement pour effet de remplacer le jugement d'un clinicien. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre professionnel de la santé. Si d'une façon ou d'une autre vous faisiez une mauvaise utilisation de l'information contenue dans ce document, le CHU de Québec ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.



Droits d'auteur

Aucune reproduction complète ou partielle de ce document n'est permise sans l'autorisation écrite du CHU de Québec-Université Laval et autre(s) au besoin. © CHU de Québec ou autre(s) au besoin, 2018. Toutefois, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour un usage professionnel.