

Feuille d'information destiné au patient Lapatinib (Tykerb^{MD})

Le lapatinib (Tykerb^{MD}) est un médicament qui bloque le récepteur HER2 et le facteur de croissance épidermique humain (EGFr) tous deux présents dans la membrane des cellules cancéreuses. Il empêche ainsi la croissance et la prolifération de celles-ci. Le lapatinib n'est pas une chimiothérapie. Il fait partie d'une nouvelle famille de médicaments utilisée dans le traitement du cancer appelée thérapie ciblée.

Dose, voie et horaire d'administration:

Le lapatinib s'administre par voie orale 1 fois par jour. Il est important de prendre ce médicament à jeun c'est-à-dire au moins 1 heure avant ou au moins 1 heure après un déjeuner à faible teneur en matières grasses afin de favoriser une bonne absorption du médicament. Vous devez éviter d'écraser, de couper ou de dissoudre les comprimés de lapatinib. Vous pourriez recevoir ce traitement tant qu'il est efficace et que vous le tolérez bien.

Interactions médicamenteuses:

Au début de votre traitement, le pharmacien vérifiera si les médicaments que vous prenez sont compatibles avec la prise de lapatinib. Par la suite, il est important d'aviser le pharmacien avant d'utiliser un nouveau médicament (prescrit ou de vente libre) car certains peuvent être contre-indiqués en raison d'interactions avec le lapatinib.


De plus, il est à noter que les pamplemousses (pulpe), le jus de pamplemousses, les caramboles et les oranges de Séville (oranges amères) sont à éviter car ils interagissent avec le lapatinib et peuvent altérer son efficacité.

Effets indésirables fréquents du lapatinib:

Effets secondaires	Mesures à prendre
Nausées légères	<ul style="list-style-type: none"> - Prendre 1 comprimé de Stémétil^{MD} ou de Graval^{MD} aux 4 à 6 heures. - Prendre de petits repas plus fréquemment. - Communiquez avec votre pharmacien si vous avez des nausées et vomissements qui ne sont pas soulagés par vos médicaments.
Diarrhées	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous de bien vous hydrater (eau, Gastrolyte^{MD}, bouillon de poulet, dessert à base de gélatine (Jell-O^{MD}), etc). - Évitez les boissons sucrées et les plats épicés, gras ou frits de même que le chou, les choux de Bruxelles et le brocoli qui peuvent aggraver la diarrhée et les symptômes associés tels ballonnements, crampes et gaz. - Favoriser les aliments « constipants » tels : bananes, riz, compote de pomme et rôties (pain grillé). - <u>Si vous avez moins de 4 selles molles par jour</u> : Débutez Imodium^{MD} en suivant les directives indiquées sur l'emballage, soit 2 comprimés immédiatement puis 1 comprimé après chaque selle diarrhéique. - <u>Si vous avez 4 à 6 selles par jour ou une selle nocturne</u>, débutez Imodium^{MD} à raison de 2 comprimés immédiatement puis 1 comprimé aux 2 heures de jour ou 2 comprimés aux 4 heures la nuit. Cesser l'Imodium 12 heures après la dernière selle diarrhéique. Cette dose est plus élevée que celle recommandée sur l'emballage, mais il est important de prendre une dose élevée pour freiner la diarrhée. - Avisez le pharmacien de l'hôpital si votre diarrhée ne s'améliore pas après 12 à 24 heures de traitement avec Imodium^{MD}.

Effets secondaires	Mesures à prendre
<p>Éruptions cutanées (rash)</p> <p>La plupart des éruptions cutanées associées au lapatinib sont d'intensité légère à modérée et apparaissent au début du traitement. Elles se présentent habituellement au niveau du tronc et plus rarement au visage. Elles se résorbent généralement au cours du traitement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pour prévenir l'apparition d'éruptions cutanées, hydratez votre peau 2 fois par jour (corps et visage) avec une crème hydratante sans parfum, sans alcool et sans colorant. - Utilisez un savon doux et des huiles de bain ou pour la douche afin d'éviter que la peau ne s'assèche. - Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30). - Si vous développez des éruptions cutanées (boutons, rougeurs) (visage et/ou corps), communiquez avec le pharmacien de la clinique qui pourra vous suggérer un traitement en lotion ou en crème ou par voie orale selon l'aspect, la localisation et la sévérité de vos lésions.
<p>Ulcères buccaux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brossez-vous les dents régulièrement - Utilisez un rince-bouche à base d'eau et de sel avec ou sans soda. Gargarisez-vous 4 fois par jour après les repas et au coucher. Ne buvez et ne mangez pas dans les 30 minutes qui suivent votre gargarisme. - Évitez les rince-bouche commerciaux contenant de l'alcool. Amosan et Oral-B sans alcool peuvent être utilisés. - Si des ulcères, de la sensibilité ou des rougeurs à l'intérieur de la bouche apparaissent, contactez-nous sans délai.

Consultez sans tarder si :



- vous présentez de la **fièvre** (température supérieure ou égale à 38,3°C ou température supérieure ou égale à 38°C à deux reprises à 1 heure d'intervalle)
- vous présentez un **essoufflement important, un rythme cardiaque anormal ou une jaunisse.**

Les pharmaciens de la clinique d'oncologie de l'hôpital du Saint-Sacrement