



DEMANDE D'EXAMEN DE TOMODENSITOMÉTRIE (TDM)

LE DÉLAI DE RENDEZ-VOUS SERA DÉTERMINÉ APRÈS ÉVALUATION PAR L'ÉQUIPE D'IMAGERIE MÉDICALE ET SELON LES DISPOBILITÉS DU PLATEAU TECHNIQUE.

Provenance de la demande	Mobilité	Lieu de l'examen
<input type="checkbox"/> Hospitalisé <input type="checkbox"/> Urgence <input type="checkbox"/> Externe	<input type="checkbox"/> Ambulant <input type="checkbox"/> Fauteuil roulant <input type="checkbox"/> Civière <input type="checkbox"/> Lit	<input type="checkbox"/> Première disponibilité <input type="checkbox"/> HEJ <input type="checkbox"/> HSFA <input type="checkbox"/> HDQ <input type="checkbox"/> HSS <input type="checkbox"/> CHUL

Précautions additionnelles : Non Oui Ne sais pas
 Si oui, préciser : Aérienne Gouttelettes/contact Contact Contact renforcé Autre : _____

Niveau de priorité MSSS (OBLIGATOIRE)

Urgent (0 à 24 H) A (1-3 jours) B (4-10 jours) C (11-28 jours) D (moins de 3 mois) _____
 E (plus de 3 mois) _____ Contrôle (aaaa/mm/jj): _____ Projet de recherche : _____

EXAMEN(S) DEMANDÉ(S): _____

INDICATIONS CLINIQUES: _____

Réaction(s) à un agent de contraste iodé ? Non Oui

Type de réaction(s)

- Urticaire
- Rougeur
- Difficulté respiratoire
- Choc anaphylactique
- Autre _____

(Voir préparation au verso)

Poids de l'usager : _____ kg _____ lb

Créatininémie obligatoire si un des facteurs de risque NIACI présent

Aucun facteur de risque présent confirmé par: _____ (initiales obligatoires)

Usager AMBULATOIRE

- Maladie rénale
- Porteur de greffon rénal
- Si recommandé de voir un spécialiste des maladies rénales

Usager secteur URGENCÉ ou HOSPITALISÉ

- 70 ans et plus
- Chimiothérapie (cancer actif en cours de traitement ou traitement dans les 6 dernières semaines)
- Diabète
- Maladie cardiaque
- Maladie rénale, porteur de greffon rénal, recommandé de voir un spécialiste des maladies rénales

Résultat de la DFG(e) ou créatininémie

Créatininémie : _____ mcmol/l DFG(e) : _____ ml/min/1.73 m²

Date (aaaa/mm/jj) : _____ / _____ / _____

(Usager AMBULATOIRE valide dans le dernier 6 mois)

(Usager URG ou HOSPI valide dans les derniers 7 jours)

Si non disponible, créatininémie prescrite pour l'examen

MÉDECIN DEMANDEUR Nom : _____ Prénom : _____

N° de permis : _____ Signature : _____ Date (aaaa/mm/jj) : _____

C. C. : _____ Heure (hh:mm) : _____

*****À TITRE INFORMATIF*******1. Préparation pour les allergies aux agents de contraste iodé**

IMPORTANT : si doute d'allergie sévère antérieure ou choc anaphylactique, consulter le radiologue responsable avant de débuter la préparation

Préparation non-urgente	Préparation semi-urgente	Préparation urgente
<ul style="list-style-type: none"> Prednisone 50 mg PO 13 h, 7 h et 1 h avant l'heure prévue de l'examen. Diphenhydramine (Bénadryl^{MD}) 50mg PO 1 heure avant l'heure prévue de l'examen. 	<p>(entre 13 h et 4 h avant l'examen) ou si aucun médicament par voie orale possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Méthylprednisolone (SoluMEDROL^{MD}) 40 mg IV 4 heures avant la procédure X 1 dose ET Diphenhydramine (Bénadryl^{MD}) 50 mg IV 1 heure avant la procédure 	<p>(moins de 4 heures avant l'examen)</p> <p>***Consulter le radiologue responsable avant de débuter la préparation</p> <ul style="list-style-type: none"> Diphenhydramine (Bénadryl^{MD}) 50 mg IV 1 heure avant l'examen <p>*Corticostéroïde non recommandé pour cette situation</p>

2. Protocole de prévention de la néphropathie induite par un agent de contraste iodé (NIACI)

Usager ambulatoire avec DFG(e) inférieur à 30 ml/min/1,73m²	Usager hospitalisé ou de l'urgence avec DFG(e) supérieur à 30 et inférieur ou égal à 60 ml/min/1,73 m²
<p><i>Le radiologue et le médecin requérant évaluent les risques/bénéfices. Si l'examen requiert un agent de contraste iodé ; Prise en charge au CHU de Québec-UL.</i></p> <p>Au médecin requérant ou à la pharmacie communautaire, il est recommandé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cesser la metFORMINE (contre-indiquée à <30 ml/min) ○ Omettre diurétiques de l'anse (furosémide, bumétanide, acide éthacrylique) et métolazone le jour de l'examen ○ Contrôle de la créatinine : prélèvement 5 jours post-examen. Le patient se présente avec son ordonnance au centre de prélèvement de son choix. 	<p>Usager hospitalisé avec DFG(e) inférieur à 30ml/min/1,73m²</p> <p><i>Le radiologue et le médecin requérant évaluent les risques/bénéfices. Si l'examen requiert un agent de contraste iodé ;</i></p> <p>Remplir l'ordonnance pré-imprimée afin d'entamer la conduite recommandée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Faire boire 500 ml d'eau pré-examen ○ Omettre diurétiques de l'anse (furosémide, bumétanide, acide éthacrylique) et métolazone le jour de l'examen ○ Hydratation intraveineuse (sur l'ordonnance pré-imprimée): <ul style="list-style-type: none"> ○ NaCl 0,9% : 3 ml/kg/heure pour 1 heure pré-examen (maximum : 300 ml); puis 1,5 ml/kg/heure pour 4 heures post-examen (maximum 150 ml/heure) suivant le retour de l'usager à l'unité de soins après l'examen. ○ Cesser la metFORMINE le jour de l'examen. Reprise à évaluer par médecin traitant (contre-indiquée à <30 ml/min). ○ Omettre diurétiques de l'anse (furosémide, bumétanide, acide éthacrylique) et ou métolazone le jour de l'examen. ○ Contrôle de la créatinine : prélèvement 48 heures post-examen.