

Grille déterminant l'équipe de transfert selon les besoins du patient

Stabilité		Stable	Stable/Instable
Niveau		Infirmière (Navette)	Présence d'un médecin (avion-hôpital)
Risque de détérioration		Nul Aucun prévisible	Faible/Modéré /Élevé Risque de décès ou d'atteinte sérieuse des fonctions ou des organes Possibilité d'intervention médicale durant le transport
État clinique	Airway Breathing	<ul style="list-style-type: none"> ‡Oxygénothérapie simple ‡Drain thoracique, sous Pleur-Évac ou Heimlich ‡Hémothorax drainé (drainage initial <100cc, avec saignement peu actif) ‡Trachéotomisé sans respirateur ‡Asthme, MPOC, infection des voies respiratoires inférieures sans détresse respiratoire 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Intubé ‡CPAP, BiPAP ‡Respirateur ‡Patient sous sédation ‡Détresse respiratoire ‡À risque de compromis respiratoire ou ventilatoire
	Circulation	<ul style="list-style-type: none"> ‡Problème cardiaque : Ø douleur, Ø d'arythmie depuis 8hres et les Troponines sont négatives ou décroissantes, pas de dyspnée de novo (peut recevoir médication IV) ‡Si connu cardiaque peut avoir eu douleur < 8hres mais a été soulagé rapidement avec prise de Nitro maximum 3 doses, douleur de courte durée sans récurrence. ‡Insuffisance coronarienne stabilisée et transfert pour examen hémodynamique ‡Pathologie abdominale non traumatique ‡Appendicite, douleurs abdominales sans instabilité ‡Produits sanguins en cours aucune instabilité hémodynamique 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Arrêt cardiorespiratoire avant le transfert ‡Instabilité des signes vitaux ‡Instabilité hémodynamique (état de choc) ‡Mobitz 2 et plus ‡Pace externe ‡Infarctus myocardique aigu ‡Angine instable mal contrôlée ‡Risque de décès imminent ‡Produits sanguins en cours pour contrer un état de choc
	Disability	<ul style="list-style-type: none"> ‡Pathologie neurologique stabilisée avec Glasgow >10 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Glasgow <10 ou >10 instable ‡ Instabilité des signes neurologiques
	Exposure	<ul style="list-style-type: none"> ‡Fractures simples des membres ‡Amputation traumatique pour réimplantation ‡Sonde urinaire/TNG ‡Brûlure légère sans risques de complications. 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Brûlures complexes, risques de complications ou brûlure au visage. ‡Polytraumatisé
Grossesse	<ul style="list-style-type: none"> ‡Transfert préventif de grossesse ‡Pré-éclampsie légère 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Travail prématuré ‡Pré-éclampsie sévère ‡Travail actif sur le point d'accoucher 	
Néonatalogie	<ul style="list-style-type: none"> ‡Néonatalogie stable <ul style="list-style-type: none"> · Imperforation anale · Malformation des membres 	<ul style="list-style-type: none"> ‡Néonatalogie à risque <ul style="list-style-type: none"> · Immaturité · Syndrome membranes hyalines · Cardiopathie · Hernie diaphragmatique 	
Selon la décision du néonatalogiste au centre receveur			