

Programme québécois de dépistage du cancer coloretal (PQDCCR)


Hôpital Saint-François d'Assise :

10, rue de l'Espinau, Québec (Québec) G1L 3L5
Endoscopie, local A1-121



Hôpital du Saint-Sacrement :

1050, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 4L8
Accueil de la clinique externe de gastro-entérologie



3 RECOMMANDATIONS APRÈS UNE COLOSCOPIE LONGUE



Experts et humains



Centre hospitalier
affilié universitaire
de Québec

Agence de la santé
et des services
sociaux de la Capitale-
Nationale

Québec



Il importe de noter que ce guide émet des recommandations conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa publication, soit en juin 2012. Toutefois, ces recommandations n'ont aucunement pour effet de remplacer le jugement d'un clinicien. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec l'équipe de professionnels de la santé qui vous supportera dans vos besoins de santé. Si, d'une façon ou d'une autre, vous faisiez une mauvaise utilisation de l'information contenue dans ce document, le CHUQ et le CHA ne pourront être tenus responsables de dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.

Projet conjoint CHUQ - CHA



Experts et humains



Centre hospitalier
affilié universitaire
de Québec

Agence de la santé
et des services
sociaux de la Capitale-
Nationale

Québec



RECOMMANDATIONS APRÈS UNE COLOSCOPIE LONGUE

La coloscopie est habituellement une technique sécuritaire mais des complications peuvent survenir, comme cela vous aura déjà été expliqué avant l'examen par votre médecin.

Un saignement rectal peut survenir à la suite des biopsies ou de l'extraction de polypes. Habituellement, le saignement arrête spontanément. Toutefois, cela peut nécessiter de recevoir des transfusions de sang ou d'être hospitalisé quelques jours. Plus rarement, une perforation de l'intestin peut survenir. Ceci se manifeste par des douleurs abdominales importantes et nécessite une hospitalisation urgente.

Enfin, comme on vous aura installé un cathéter dans une veine pour administrer des médicaments, il peut arriver qu'une inflammation survienne au niveau de cette veine. Il s'agit d'une rougeur ou un gonflement local qui habituellement peut être facilement traité par des compresses d'eau chaude.

Après la coloscopie :

- Après une coloscopie, vous serez observé pendant une période d'environ 1 heure à l'hôpital. L'infirmière vous informera du moment approprié pour votre départ.
- Les malaises les plus fréquents après l'examen sont une sensation passagère de gonflement ou de crampes abdominales. Vous pouvez également être somnolent si vous avez reçu une sédation pour l'examen. Par conséquent, vous pourriez avoir de la difficulté à vous concentrer. Il est donc recommandé de ne pas retourner au travail le même jour et d'éviter de conduire une automobile jusqu'à 24 heures après l'examen. À moins d'avis contraire, vous pouvez retourner à une diète normale.

Complications :

Les symptômes suivants doivent être pris au sérieux. Vous devez consulter à l'urgence de l'hôpital où vous avez subi l'examen ou dans l'hôpital de votre région dans les plus brefs délais, si vous avez :

- Des douleurs abdominales sévères ou persistantes après l'examen.
- Des vomissements.
- De la fièvre.
- Des saignements importants par le rectum.

***Nous vous remercions de la confiance
à l'égard de notre équipe
et nous espérons avoir répondu
adéquatement à vos besoins de santé.***